

Необходимые условия для проведения эндоскопии под наркозом

Необходимые условия для проведения наркоза:

1. Ребенок должен быть соматически здоров. Период реконвалесценции (выздоровления) после перенесенной ОРВИ/ОРЗ — не менее двух недель;
2. Если ребенок наблюдается у других врачей, специалистов, направивших на обследование, обязательно заключение о состоянии и течении «непрофильного» заболевания. Заключение должно быть выдано не позднее **1 месяца** на момент проведения наркоза.

Период преднаркозного голодания:

1. **Дети до 1 года, находящиеся на грудном вскармливании** - строгая голодная пауза за **4 (четыре) часа** до наркоза;
2. **Дети старше 1 года (независимо от вида вскармливания)** - строгая голодная пауза за **6 (шесть) часов** до наркоза;
3. **Дети, находящиеся на смешанном/искусственном вскармливании** - строгая голодная пауза за **6 (шесть) часов** до наркоза;

Пример расчета периода преднаркозного голодания:

- Время исследования — 12:00;
- Последний прием пищи и лекарственных препаратов — до 6:00 ($12 - 6 = 6$);
- Последний прием жидкости — до 8:00 ($12 - 4 = 8$).

Необходимое преднаркозное обследование:

1. Общий анализ крови (давность не более 10-ти дней)
2. Биохимический анализ крови (давность не более 14-ти дней):
 - общий белок
 - глюкоза
 - АЛТ, АСТ
 - билирубин общий
 - креатинин
 - мочевины
 - калий, натрий, хлор
 - кальций
 - альбумин
3. Коагулограмма (АЧТВ, МНО, фибриноген, ПВ по Квику) (давность не более 14-ти дней).
4. Исследование на сифилис, маркеры вирусных гепатитов В и С (HBsAg и Anti-HCV), ВИЧ-инфекцию (давность не более 3-х месяцев).
5. ЭКГ с расшифровкой (необходима сама пленка) (давность не более 3-х месяцев).

Врач анестезиолог оставляет за собой право отказаться от проведения наркоза:

- При несоблюдении периода преднаркового голодания;
- При необходимости дополнительного обследования, по результатам осмотра;
- При выявленных признаках ОРВИ/ОРЗ;
- При наличии повышенной температуры, даже без признаков ОРВИ/ОРЗ;
- При невыполнении преднаркового обследования;
- При выявленных отклонениях от физиологической и возрастной нормы результатов преднаркового обследования;
- При прочих обстоятельствах, осложняющих проведение наркоза, которые могут вызвать нарушения жизненно важных функций организма во время наркоза.